



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Pelvoux

Rédigé le dimanche 7 avril 2024 à 16h

Redige te diffialiche / avrit 2024 a Toll




Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Estimation des risques

lundi 08 avril





Tendance pour le mardi 09 avril



Risque en hausse mardi avec l'arrivée d'une perturbation dans la nuit de lundi à mardi apportant de la neige à haute altitude.


Risque limité.

Départs spontanés : avalanche de neige humide, rarement grande. **Déclenchements skieurs :** instabilités résiduelles en altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 8 avril 2024 au soir






DÉPARTS SPONTANÉS: des avalanches de neige humide sont possibles dès la matinée en raison du faible regel nocturne. Elles se produisent principalement en pentes raides et dans toutes les orientations, mais l'activité devrait être réduite en raison de la couverture nuageuse. De taille généralement petite à moyenne, rares grandes possibles dans le cas d'humidification jusqu'à une couche fragile plus profondément enfouie. Par ailleurs, des avalanches de glissement peuvent se produire dans le cas de présence de reptations, de taille moyenne à grande. De nombreuses corniches localement très épaisses sont également en places sur les crêtes, pouvant dans de rares cas céder au fil de l'humidification et générer une avalanche de taille moyenne, parfois grande.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: plaques résiduelles à haute altitude (au-dessus de 2700/2800 m environ) dans les versants nord à est. Elles sont généralement peu épaisses et deviennent difficiles à déclencher par un seul skieur. Très localement, des cassures plus épaisses peuvent se produire dans les versants froids (nord-ouest à nord-est). Plus bas que 2700/2800 m environ, le manteau est généralement bien stabilisé au matin après le regel nocturne, mais un skieur pourra encore déclencher un départ de neige humide en pente raide, prenant parfois de l'ampleur.







Qualité de la neige

Enneigement débutant encore vers 1600 m en ubacs, skiable à partir de 1600/1800 m selon les secteurs. Il est excédentaire à toute altitude pour un début avril, et particulièrement abondant à partir de 2000/2200 m. Manteau neigeux en cycle printanier avec un regel médiocre au levé du jour en raison du ciel couvert, puis une humidification du manteau qui reprend rapidement en cours de matinée. L'humidification continue de gagner en profondeur dans les versants ensoleillés jusqu'à haute altitude. En versant nord, humidification au moins superficielle jusque vers 2800/3000 m environ. On trouve encore le matin de la neige restée sèche en versant nord au-dessus de 2700/2800 m reposant sur de la neige fortement travaillée par le vent. Corniches localement très épaisses sur les crêtes.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Pelvoux

Rédigé le dimanche 7 avril 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	lun. 01/04				mar. 02/04				mer. 03/04				jeu. 04/04				ven. 05/04				sam. 06/04				dim. 07/04			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	2	-	4	4	- Jr.			2	4	2	<u>~</u>]	·U·	*	-	~]	*	W			W	AP)			¥	AP)	-	p	*
Vent (km/h)	50	40	40	35	30	30	25	20	30	40	30	40	25	20	35	35	20	30	30	15	25	30	30	40	50	35	40	45
à 3000m	↑	→	→	→	→	→	→	→	7	→	→	→	24	→	→	→	→	7	→	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Vent (km/h)	25	5	25	5	20	15	20	15	20	15	10	10	20	15	15	10	10	10	5	10	15	20	20	20	25	15	15	15
à 2000m	K	+	→	+	→	7	*	7	^	*	^	↑	2	*	*	K	K	K	K	K	7	7	7	7	7	7	^	7

