





Estimation des risques pour le :

SAMEDI 28 FÉVRIER

ÉPAIS MANTEAU STABILISÉ DANS DE NOMBREUSES PENTES. RISQUE RÉSIDUEL DE PLAQUE DE FOND.



Indice de risque limité.

Départs spontanés : épaisses plaques de fond.

Déclenchements provoqués : rares plaques encore dans les secteurs ventés d'altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



avalanches de fond



couche fragile persistante

Départs spontanés :

- De rares mais épaisses plaques de fond peuvent descendre spontanément, quelles que soient l'heure et l'orientation. Plutôt sous 2200/2400 m et dans les pentes habituelles (herbe, dalle rocheuse). Le manteau neigeux actuel étant épais, les volumes mobilisés peuvent être plus conséquents que d'habitude. **Lourdes avalanches de taille 2 à 3 (moyenne à grande).**

- Sous 2400 m, la poursuite de l'humidification cause **quelques départs humides** dans les pentes raides non purgées, parfois en larges plaques. Plutôt de taille 1 à 2. Rare taille 3 possible lorsque l'humidification atteint des couches fragiles (plutôt en O/N/E).

Déclenchements provoqués :

- **Au-dessus de 2000 m, en versants O/N/E, rares plaques** formée par le vent. **Facteur aggravant** : dans ces mêmes versants mais aussi en Sud à haute altitude, des couches fragiles persistantes sont en place. Le déclenchement est **plus facile dans les zones moins enneigées** (abords de crête, etc) car la couche fragile est plus près de la surface. Grande avalanche (taille 3) possible. D'anciennes plaques faiblement recouvertes de neige peuvent être facilement re-déclenchées (couche fragile persistante faiblement ré-enfouie).

- Ailleurs, le déclenchement est peu probable car la couche fragile est généralement profondément enfouie (donc très difficilement sollicitable par un skieur).

Qualité de la neige

Enneigement : après les chutes de neige de mi février, l'enneigement était devenu excédentaire à toutes altitudes. Les températures anormalement douces et le tassement font rentrer l'enneigement dans la normale, surtout en Sud et en basse montagne où la limite d'enneigement dans ces pentes remonte vite. Ailleurs le manteau se tasse considérablement.


Limite skiable : encore skiable dès 1100 m dans les prairies orientées Nord, plutôt 1400 m en Sud.

Qualité de la neige :


En Sud, croûte portante au réveil qui ramollie plus ou moins bien en fonction de l'épaisseur de la couche nuageuse et de l'altitude.

En Nord, neige croutée sous 1800/2000 m, s'humidifiant doucement. Plus haut, neige encore froide, poudreuse dense à l'abri du vent, cartonnée voire dure dans les secteurs ventés (à l'approche des crêtes). Elle tend à s'humidifier jusque vers 2400 m en cours de journée.

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du dimanche 01 mars



Indice de risque limité


Risque stationnaire. Temps couvert avec quelques anecdotiques flocons. L'humidification est moins marquée que les jours précédents.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	sam. 21/02				dim. 22/02				lun. 23/02				mar. 24/02				mer. 25/02				jeu. 26/02				ven. 27/02			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo																												
Vent (km/h)	60	80	80	80	40	50	60	60	65	60	55	45	35	35	30	25	20	20	20	15	15	15	15	15	15	20	20	
à 3500m																												
Vent (km/h)	40	40	40	30	20	25	40	45	50	45	40	30	20	15	15	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	
à 2500m																												



Risque d'avalanche							
	sam. 21/02	dim. 22/02	lun. 23/02	mar. 24/02	mer. 25/02	jeu. 26/02	ven. 27/02



Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>